


HOKOEX®

HOKOEX®


För bekämpning av besvärande
fluglarver inom djurhållning.

Behandlingar i boskapsstallar



1. Dränerade golv-system

Applicera på hela golvytan omedelbart efter rengöring.
Applicera även på kanterna av golvet tvärribbor där gödsel kan finnas kvar.



2. Djupströbäddar

Behandla helst cirka tre dagar efter rengöring av båsen.
Behandla ett 50 cm brett stråk längs alla väggar, runt stolpar samt vid foder- och vattentråg.
Platser med komprimerat strö behöver inte behandlas.

Upprepa behandlingen igen så snart larverna återkommer, i allmänhet efter 1–2 månader. Kontrollera helst gödselplatsen för larver.

Notera att tillväxten av flugor påverkas av temperatur, luftfuktighet och gödselmängd.

 **Pelsis**

Pelsis
Tanaco A/S
Limfjordsvej 1
6715 Esbjerg N
Denmark
nordics@pelsis.com
+45 75 14 48 00

HOKOEX för boskapsuppfödare /



INGA FLUGOR – INGA BEKYMMER

Flugor på boskapsgårdar är inte bara en olägenhet, utan överför även sjukdomar, som exempelvis mastit och mul- och klövsjuka, vilket resulterar i produktionsförluster. Flugorna distraherar dessutom djuren när de utfodras och framkallar försvarsmekanismer, som förbrukar energi med minskad viktökning och mjölkproduktion som resultat.

Boskaphållning för med sig gödselansamling och attraherar flugor. De kommer att lägga ägg i gödselsamlingarna. Endast en bråkdel av äggen utvecklas till vuxna flugor synliga för blottat ögat, medan merparten förblir i olika utvecklingsstadier i själva gödseln. Kalvboxar med halmströ är särskilt benägna att bidra till flugutvecklingen.

Hokoex innehåller en beprövad insektsväxtregulator som stör utvecklingen av larvstadierna och förhindrar dem från att mogna till livskraftiga vuxna flugor, vilket därmed effektivt bryter utvecklingscykeln.

Principen för kontroll av flugor i nötkreaturshållning

Med tanke på att fluglarver utvecklas i gödsel är regelbunden borttagning av gödseln en primär komponent vid kontroll av flugor

Fullständig borttagning är dock varken nödvändigt eller fördelaktigt, eftersom nyttig fauna då också skulle försvinna.

Den första behandlingen bör alltid ske kort efter rengöringen. Kontroll av gödseln för larver därefter rekommenderas och behandlingen ska upprepas så snart larverna återkommer. Detta maximerar intervallen mellan behandlingstillfällena och minskar produktanvändningen samtidigt som applikationsarbetet optimeras.

Vid korrekt applicering bryter HOKOEX utvecklingscykeln och adulticid-behandling av vuxna flugor krävs inte.


Platser som kräver behandling

Mjölkgårdar

- Gödsel och urinindräkt strö är en idealisk fortplantningsplats för flugor (t.ex. dräktighetsbåsar och kalvbåsar)
- Kalvhyddor utomhus (strö, gödsel, urin och foderspill)
- Spillområden runt foder- och vattentråg
- Alla andra platser där gödsel ansamlas

Boskapsgårdar

- Sjukfällor
- Stallområden utan komprimerat strö
- Kalvhyddor
- Utomhusinläggnader
- Spillt foder
- Våta områden vid utfodringsplatsen
- Ensilagekanter



Fördelar med HOKOEX-larvgiftbehandling

- Minskning av flugpopulationer under olägenhetsnivån för:
 - kreatur
 - gårdsarbetare
 - grannar till boskapsstallar
- Enkel användning med blygsam arbetsinsats
- Långa intervaller mellan appliceringarna
- Inga ytterligare åtgärder för adulticid-behandling av flugor krävs
- Förbättrad biosäkerhet tack vare minskning av flugburna sjukdomar
- Förebygger ekonomiska förluster

Appliceringsmetoder

HOKOEX-granulat appliceras huvudsakligen genom direkt spridning av granulatet alternativt bevattning eller besprutning med **HOKOEX** upplöst i vatten. Om gödselytan är torr, appliceras medlet antingen genom bevattning eller besprutning.

Effektiviteten är den samma oavsett vald appliceringsmetod. Alla områden där larver kan utvecklas eller ägg läggas måste behandlas. Detta inkluderar även skraputrustning samt områden kring vattentråg där strö kan vara fuktigt.



HOKOEX®

