


HOKOEX[®]

Hur man utför behandling i olika fjäderfåhållningssystem




1. Utomhusburar över grunda gropar

Applicera på hela gödselytan genom besprutning eller uthällning cirka en vecka efter borttagning av gödseln. Kom ihåg att lämna kvar lite gödsel runt stolparna vid rengöringen, eftersom den sannolikt hyser nyttiga organismer.



2. Byggnader med burar över grunda gropar

Behandla som öppna burar med grunda gropar. I stängda byggnader kan gödseln också fastna på plattformarna. Skrapa alla plattformar rena före behandling.



3. Byggnader med burar över djupa gropar

Spreja hela gödselytan en vecka efter borttagning av gödseln. Kom ihåg att lämna kvar lite gödsel runt stolparna vid rengöringen, eftersom den sannolikt hyser nyttiga organismer.



4. Byggnader med frekvent gödselborttagning med skrapor

Identifiera de områden där gödsel ansamlas och behandla via besprutning där det är möjligt.



5. Fjäderfåbyggnader med spaltgolv

Ta bort gödseln, men kom ihåg att lämna kvar lite av den för att undvika att alla nyttiga organismer försvinner. Spreja eller häll på Hokoex en vecka senare.



6. Broiler-anläggningar


Spreja eller häll på Hokoex en vecka efter gödselborttagning. Kom ihåg att lämna kvar lite gödsel vid rengöringen, eftersom den sannolikt hyser nyttiga organismer.

Upprepa behandlingen igen så snart larverna återkommer, i allmänhet efter 1–2 månader. Kontrollera helst gödselplatsen för larver.

Notera att tillväxten av flugor påverkas av temperatur, luftfuktighet och gödselmängd.

HOKOEX[®]

För bekämpning av besvärande fluglarver inom djurhållning.



 **Pelsis**


Pelsis
Tanaco A/S
Limfjordsvej 1
6715 Esbjerg N
Denmark
nordics@pelsis.com
+45 75 14 48 00

INGA FLUGOR – INGA BEKYMMER

Flugor i fjäderfäanläggningar är inte bara en olägenhet utan för även med sig överföring av sjukdomar, som resulterar i produktionsförluster.

Intensiv fjäderfäuppfödning attraherar obönhörligen flugor. De kommer att lägga ägg i gödselsamlingarna. Endast en bråkdel av äggen utvecklas till vuxna flugor synliga för blottat ögat, medan merparten förblir i olika utvecklingsstadier i själva gödseln.

Hokoex innehåller en beprövad insektsväxtregulator som stör utvecklingen av larvstadierna och förhindrar larverna från att mogna till livskraftiga vuxna flugor, vilket därmed bryter utvecklingscykeln.



Principen för kontroll av flugor i fjäderfäbyggnader

Med tanke på att fluglarver utvecklas i gödsel är regelbunden borttagning av gödseln en primär komponent vid kontroll av flugor.


Fullständig borttagning är dock varken nödvändigt eller fördelaktigt, eftersom nyttig fauna då också skulle försvinna.

Den första behandlingen efter utförd rengöring ska utföras efter en vecka när ett gödselskikt har återetablerats och den aktiva substansen ordentligt kan penetrera gödselskiktet där larver redan finns.

Vid korrekt applicering bryter **HOKOEX** utvecklingscykeln och adulticid-behandling av vuxna flugor krävs inte.

Ytterligare platser som kräver behandling

- Gödsel under burar och spaltgolv
- Gödsel kvarlämnad efter skrapning och spolning
- Blött strö och blöt gödsel runt vattentråg
- Gödselkontaminerade avrinningar
- Gödsel under burar och spaltgolv
- Fuktigt, spillt foder
- Döda fåglar
- Spruckna ägg



Fördelar med **HOKOEX**-larvgiftbehandling


Minskning av flugpopulationer under olägenhetsnivån för:

- kreatur
- gårdsarbetare
- grannar till fjäderfäbyggnader
- enkel användning med blygsam arbetsinsats
- långa intervaller mellan appliceringarna
- Inga ytterligare åtgärder för adulticid-behandling av flugor krävs
- Förbättrad biosäkerhet tack vare minskning av flugburna sjukdomar
- Förebygger ekonomiska förluster

Appliceringsmetoder

HOKOEX-granulat appliceras huvudsakligen genom direkt spridning av granulatet alternativt bevattning eller besprutning med **HOKOEX** upplöst i vatten. Om gödselytan är torr, appliceras medlet antingen genom bevattning eller besprutning.

Effektiviteten är den samma oavsett vald appliceringsmetod. Alla områden där larver kan utvecklas eller ägg läggas måste behandlas. Detta inkluderar även skraputrustning samt områden kring vattentråg där strö kan vara fuktigt.



HOKOEX®

